

මත්ද්‍රව්‍ය ගත් වේලාව, ප්‍රමාණය සහ ඒ සමඟ ගත් වෙනත් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විස්තර මෙමගින් සොයා ගත හැක.

මත්ද්‍රව්‍ය නොගැනීම නිසා කෙටිකාලීනව ඇතිවන රෝග තත්ත්වය කුමක්ද?

මූලික රෝග ලක්ෂණ ඇතිවීම සිදුවන්නේ රිලික්සව මත්ද්‍රව්‍ය ගැනීමට නිසැක වේලාවට මොනොනකට පෙරයි.

වේලකන ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ අතර කඳුසු ගැලීම, පොටු දියර ගැලීම, ඇතුළු යෑම සහ දහඩිය දැනීම ප්‍රධාන වේ. එසේම නොසන්සුන්කම, දැහැලීම, කෑම අරුචිය, වෙහිලීම සහ කදික් කිවීමේ යාමද ක්‍රමයෙන් ඇතිවේ. මීට අමතරව විශාදය (කළකිරීම) සහ වමනය ද ඇතිවිය හැක.

හෘද ස්පන්දනය වැඩිවීම සහ රුධිර පීඩනය වැඩිවීම සිදුවේ.

මුසා සහ බෙල්ල රත්වී රත්පැහැ වීම, සීතල ඇතිවීම සහ අධික දහඩිය දැනීම ද පැහැදිලිව හඳුනාගත් රෝග ලක්ෂණය.

අක්විල සහ පිටේ සහ අත් කතුල් වල මාංශපේශීයතේ කඳ වේදනා ඇතිවේ. එසේම එකවර ඇතිවන මාංශපේශීය කදවීම නිසා ආමාන වලන ඇතිවේ. මෙම රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර නොකළ දින 5-15 කාලය තුළදී ක්‍රමයෙන් යථා තත්වයට පත්වේ. මෙම කාලය තුළ රෝගියා පිළිබඳ විශේෂ අවාධානයක් යොමු කළ හැක.

රෝගියා හැවන මත්ද්‍රව්‍ය ගැනීමෙන් වැළැක්විය හැකිද?

බොහෝ ඇබ්බැහුවන් සඳහා දෙන ලබන මූලික ප්‍රතිකාර වලින් පසු (එනම් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අත්වූ පසු ඇතිවන අසාමාන්‍ය රෝග තත්ත්වය සුව වූ පසු) කෙටි කාලීන තෝ දිගු කාලීන ප්‍රකරණවෘත්තයක් කළ හැක.

මෙය කළහොත් වන්නේ රෝගියාගේ මානසික සහ ආර්ථික සුවතාවය වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය පරිසරයක සිටිය. බොහෝ විට දැනට එවැනි රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාර කෙරෙනුයේ රෝගවල මානසික රෝග වාර්ෂික තුළය. නිසි ප්‍රකරණවෘත්තයක් සිදු නොවේ. අධීක්ෂකයන් සහ ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරවන අධ්‍යාත්මික වීමට අවශ්‍ය නිසල පරිසරයක ප්‍රකරණවෘත්ත මධ්‍යස්ථානය පිහිටිය හැක.

දැනට රාජ්‍ය අංශය සතුව එවැනි ප්‍රකරණවෘත්ත මධ්‍යස්ථාන නොමැත. ආගමික ප්‍රකරණවෘත්ත මූලිකරණ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් යම් තරමකට හෝ ප්‍රකරණවෘත්ත මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මූලික ප්‍රකරණවෘත්තයෙන් පසුව රෝගියා සමාජගත වීමේදී යළි

මත්ද්‍රව්‍ය වලට නැඹුරු නොවීම සඳහා උපදේශන සේවාවක් ද එක් කිරීමට අධ්‍යයනයක් හෝ තාරකාවෙක්ගේ රැකවරණය යටතේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයක් ද සලසා දිය හැක.

දිගු කාලීන ආගමික පරිසරයක සිටීමට ද අධ්‍යාත්මය, අධීක්ෂකයන් සහ අතිමාන වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී සංගම් වලට බැඳී සක්‍රීය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලෙස කටයුතු කිරීමට ද ඉඩ සැලසිය හැක.

එසේම රෝගියා සම්බන්ධව වෛද්‍ය වාර්තා සහිත සම්පූර්ණ ලිපිගොනුවක් සුරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යාමද කළ හැක. රෝගියාගේ සෞඛ්‍ය සමග අනෙකුත් සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගැනීමටත් කටයුතු සැලසිය හැක.

මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර කෙබඳුද?

මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ උපදේශකයින්ගේ සහයෝගය ලබාගත හැක. මගින් මිදීමේ මගක් සෙවීමට පෙර මනෝ විද්‍යාඥයන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඉවත් කරවීම සඳහා පවුලේ අයට යම් මාර්ගෝපදේශකයක් ලබාදෙන්න. මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර වර්ග තුනක් ලබාදෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී කුසලතා වර්ධනය සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් අත්වීමේ උනන්දුව ඇති කරවන ආකාරයේ පෞරුෂත්වය නංවාලන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කෙරේ. කෙටි කාලීන සහ මධ්‍යකාලීන ප්‍රකරණවෘත්තයේදී මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තීයයින්ගේ මගපෙන්වීම සහ සෘජු අධීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍යය.

මත්ද්‍රව්‍ය හා අත්අඩංගුවට ගැනීම

මත්ද්‍රව්‍ය ගත් පුද්ගලයින් අතින් අපරාධ සහ නීති විරෝධී වැඩ සිදුවේ. එනිසා බොහෝ විට බන්ධනාගාරගත වීමට සිදුවේ.

දැනට පොලීස් සහ බන්ධනාගාර වාර්තා අනුව සබරගමුව පළාත මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ නිසා අත්අඩංගුවට ගැනීම් අතින් හතරවෙනි ස්ථානයේ පසුවේ. අපි තුමන් කළ හැකිද? හැකිතාක් දුරට සමාජය දැනුවත් කරමු. මේ තත්ත්වය වන විට සමාජයෙන් තුරන්කිරීමට බිඹේ වටිනා සහයෝගය අපේක්ෂා කරමු.

සැලසුම් හා තොරතුරු සලකුණකරණ ව්‍යාපාර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා ආධ්‍යය කාර්යාලය සබරගමුව.

අනුග්‍රහය ලෝක බැංකු සෞඛ්‍ය ආරාමය සංවර්ධන වැඩසටහන

SADISA Printers # 045-5679389

මතට ගින
ආබාධ වැඩසටහන

මොනවද මේ මත්ද්‍රව්‍ය

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සබරගමුව

මත්ද්‍රව්‍ය (Narcotics)

නින්ද ඇති කිරීමට යොදාගන්නා ද්‍රව්‍ය මේ නමින් හැඳින්වේ. බොහෝ ප්‍රබල වේදනා නාශක ගණයට අයත් වේ. වර්තමානයේ දී පොපි මලින් සාදන ලද සංයෝග (Poppy) වල අමු ඇට වලින් වෙන්කර ගත් ඇල්කලොයිඩ් මේ සඳහා යොදා ගනී. ක්‍රිස්තු පූර්ව 300 දී පමණ සිට පොපි වගාව කෙරුණු නිසාය.

මේ ඇල්කලොයිඩ් (Alkaloids), වලින් හෙරොයින් (Heroin), කෝඩේන් (Codeine) සහ මෝර්ෆින් (Morphine) වැනි ස්වභාවික සංයෝග නිෂ්පාදනය කෙරේ. මීට අමතරව ඔපියේට් (Opiate) යන නම කෘතිම නිෂ්පාදන වලටත් යෙදේ. දැනට නීති විරෝධී ලෙස මෙම කෘතිම නිෂ්පාදන සිලියෝන් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වේ.

බහුලව භාවිතා වන මත්ද්‍රව්‍ය රාශියකි.

- Cocaine - (කොකේන්)
- PCP - (පී. සී. පී.)
- LSD - (එල්. එස්. ඩී.)
- Heroin - (හෙරොයින්)
- Methamphetamine (Meth) - (මෙතැම්පෙටමින්)
- Demerol (Meperidine) - (ඩෙමරෝල්)
- Ecstasy (X, XTC or X tacy) (Methylenedioxy methamphetamine) - (එක්ස්ටසි)
- Rohypnol (Flunitrazepam) - (රොහිප්නෝල්)
- GHD (Gamma hydroxybutyrate) - (ජී. එච්. ඩී.)
- Ketamine (ketamine hydrochloride) - (කෙටමින්)

ශ්‍රී ලංකා සඳහා භාවිතා වන සමහර ව්‍යාධිග්‍රහක වලින් මත්ද්‍රව්‍ය සහ ඇබ්බැහි වීම සිදුවේ.

- Sedatives (නින්ද ඇත්කරන)
- Lolipdem - (ලොල්පිඩේම්)
- Alprazolam - (ඇල්ප්‍රොසොලෝම්)
- Diazepam - (ඩයසපැම්)
- Opioid (වේදනා නාශක)
- Oxycodone - (ඔක්සිකොඩෝන්)
- Jeperidine - (ජෙපරිඩින්)
- Hydromorphone - (හයිඩ්‍රොමෝෆෝන්)
- Morphine - (මෝර්ෆින්)
- Codeine - (කෝඩේන්)
- Tramadol - (ට්‍රැමාඩෝල්)
- Hydrocodone - (හයිඩ්‍රොකෝඩෝන්)

Narcotic analgesic (වේදනා නාශක)
Fentanyl - (ෆෙන්ටනිල්) |

ස්නායු පද්ධතියට වන බලපෑම

සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය සහ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිවල සිදුවන රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වය නියෝජනය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ. සීපියෝයිටික් විසින් ස්නායු පද්ධතියේ ඔපියේට් ප්‍රතිග්‍රාහක වලට සම්බන්ධ වී විවිධ වෙනස්කම් ඇති කරවයි.

මත්ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන අතිතකර රෝග ලක්ෂණ අතර නිද්‍රාවර්තය, කැපීම, නින්ද නොයෑම, අවධානය ගිලිහීම, උදාසීනතාව, ශරීරය නොවෙනස්වීම, ඇහේබඩා කුඩාවීම, මුහුණ සහ බෙල්ල රත්වීම සහ රත්පැහැවීම, මලබිදීම, ඔක්කාරය, වමනය සහ ස්වසන අවපාතය ප්‍රධාන වේ.

සීපියේට් ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ග කීපයකි. මේවා උත්තේජනය වීම නිසා පහත රෝග තත්වයන් ඇතිවේ.

- MU ප්‍රතිග්‍රාහක වල බලපෑම :**
 - වේදනා නාශකය (Analgesia)
 - අසාමාන්‍ය අධික සතුට (Euphoria)
 - ස්වසන අවපාතය (Respiratory depression)
 - ඇහේබඩා කුඩාවීම (Miosis)
- Kappa ප්‍රතිග්‍රාහක වල බලපෑම :**
 - වේදනා නාශකය (Analgesia)
 - ස්වසන අවපාතය (Respiratory depression)
 - ඇහේබඩා කුඩාවීම (Miosis)
 - නිද්‍රාවර්තය (Sedation)

sigma ප්‍රතිග්‍රාහක වල බලපෑම :
අසාමාන්‍ය අසතුට හෙවත් අවසිද්ධිය (Dysphasia) හැරී යෑම ඇති බවට හැඟීම, විකාර පෙනීම සහ ඇසීම (Hallucinations)
මානසික රෝගීවීම (Psychosis)

Delta ප්‍රතිග්‍රාහක වල බලපෑම :
අසාමාන්‍ය අධික සතුට (Euphoria)
වේදනා නාශකය (Analgesia)
අපස්මාරය (Seizures)

ඉහත තත්වයන් හැකි කිරීමට මීටර්ටෝප් නිලේධක භාවිතා කෙරේ.

- උදා :- Naloxone (නැලොක්සෝන්)
- Nalmefene (නැල්මේෆේන්)
- Naltrexone (නැල්ට්‍රෙක්සෝන්)

බොහෝ සීපියේට් වර්ග ආහාර මාර්ගයෙන් හා ස්වසන මාර්ගයෙන් පහසුවෙන් උරා ගැනෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නා මාර්ගය අනුව උපරිම බලපෑම ඇතිවීමට ගතවන කාලය රඳා පවතිනවා.

උදා :-	රුධිරය මගින්	→ විනාඩි 10
	නාසය මගින්	→ විනාඩි 10-15
	මාංශ පේශී මගින්	→ විනාඩි 30-45
	ගිලීමෙන්	→ විනාඩි 90
	සම මගින්	පැය 2-4

මත්ද්‍රව්‍ය ගිලීමෙන් පසු බොහෝමයක් කුඩා අන්ත්‍රයෙන් ඉතා ඉක්මනින් උරාගන්නවා. බොහෝ සීපියෝයිට් අක්මාව තුළදී අක්‍රීය සංයෝග බවට පත්වී මුත්‍රා මගින් පිටවේ.

ප්‍රොපොක්සිෆේන් (Propoxyphene) ෆෙන්ටනිල් (Fentanyl) සහ බුප්‍රෙනෝෆීන් (Buprenorphine) වැනි සමහර සීපියේට් (Opiates) වර්ග මේද වල දියවෙන නිසා මේද පටක වල තැන්පත් වේ.

අක්මා රෝග ඇති අයගේ අක්මා ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු නිසා මත්ද්‍රව්‍ය ශරීරයෙන් පිටවීම වේගය අඩුවේ.

මේ නිසා එම මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වීෂ තත්වයක් ඇතිවේ. සමහර මත්ද්‍රව්‍ය නිසා වකුගඩු අක්‍රමිකය වේ.

මරණය හෝ හයාතක රෝග ඇතිවිය හැකිද?

ස්වසන අක්‍රමිකතාව බහුලව ඇතිවන්නකි. එසේම පෙනහළු ඉදිමීම, හොනවරින අපස්මාරය සහ හෘද අක්‍රමිකතාවය ද ඇතිවිය හැක. යෂණික මරණය දී සිදුවිය හැක.

අධික මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා ඇතිවන සංකූලතා මොනවාද?

- සමී, පෙනහළු සහ මොළයේ සැරව ගෙඩි ඇතිවීම. (Abscesses)
- හෘදයේ බැක්ටීරියා හෝ දිලීර ආසාදන. (Endocarditis)
- අක්මා වර්ධන ආසාදන. (Hepatitis)
- HIV / AIDS ආසාදන.
- ස්නායු පද්ධතියේ අක්‍රමිකතාවය. (Neuropathy)
- මන්දපෝෂණය සහ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ බිඳ වැටීම. (Malnutrition and Break Down of Immunity)
- ඉන්ද්‍රියයන්ගේ දිගුකාලීන රෝග තත්වයන්. (Chronic Diseases)

රෝග ඉතිහාසය
රෝගියාගේ ලග සිටින්නෙකු, පවුලේ කෙනෙක් හෝ යහළුවෙක් ගෙන් විමසිය හැක.

01. සිසිලු බොහ මත්පැන් ප්‍රමාණය අඩු කරන සිහි මගල සිහිපානයද?
02. වෛද්‍ය විමර්ශන ගත අත් අප වේදනාවකට දෝෂ පවරා සිටියොද?
03. විමර්ශන වැරදි ලෙසද නෝ ඉන් පත්වනවා විමර්ශන ගත අත් අපද?
04. පර්යේෂණ මගින්ම දැනට ප්‍රදේශීය වීම් පවත්වාගන්න?

- C - Cut Down - (අඩු කිරීම)
- A - Annoyed by Criticism - (දෝෂ පවරා)
- G - Guilty about drinking - (වරදක් කළ බව හැඟීම)
- E - Eye-opener drinks - (අවදානම් සහිත මත්පැන් පානය පවත්වාගැනීම)

මෙම පරීක්ෂණය මගින් අය සඳහා වූ ප්‍රශ්න සහිත මිනිසුන්ගේ (Michigan) පරීක්ෂණය ද යොදා ගන්න පුළුවන. (Michigan Alcoholism Screening Test (MAST))

වළක්වාගැනීම සහ රෝගීන් සොයා ගැනීම.

- මත්පැන් බීමේ ප්‍රවේශය මග හැරිය යුතුය.
- නොමනා අය සමඟ මිතුරන් ඇතිකළ යුතුය.
- ප්‍රශ්නයක් මතු වූ විට වේගවත්ව දෝෂ පවරා නොගතව.
- එවැනි සහතිකයක් සිටින නිසා ප්‍රදේශීය කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ වීම.
- මත්පැන් වරදක් සංගමය මගින් වේදනාවක් ඇතිවීමට ප්‍රවේශයක්.
- එහි සාමාජිකයින් එකිනෙකාට ප්‍රවේශයක් සහතිකයක් ඇතිවීමට වෙර දැරිය යුතුය.

කෙටිකාලීන පුනර්ත්ථාපනය

ප්‍රතිකාර

ඉක්මන් සත්කාර :
මත්පැන් නැවැත්වීම නිසා සමහරවිට ඉක්මන් කාර්යක්ෂම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වේ. සාමාන්‍යයෙන් එම ලක්ෂණ අවසන් වීමටත් පැය තුනක් සහ හතලිස් අටක් අතරදී ඇතිවිය හැක. රෝග ලක්ෂණ අතර වේරිලීම (Tremors), දුර්වලතම (Weakness), අපස්මාරයන්ගේ (Seizures), හැඩි දෝෂ ඇති ලෙස දැකීම (Hallucinations), නොසන්සුන්තාවය (Anxiety), කැඩී වැඩිවීම (Increased rate) සහ අධික රුධිර පීඩනය (high blood pressure)

ප්‍රතිකාර නොලැබෙන්නේ බීම නවතා දීම දෙසට සහ ද්‍රව්‍ය අත්හැරීම හැරුණු විට පමණක් නොවන අතර Delirium tremens ඇතිවේ. එහි රෝග ලක්ෂණ අතර නොසන්සුන්තම (Anxiety), විනාශකාරීතාවය (Confusion), හින්දු හොහොම (Inability to sleep), හපුරු සිහින දැකීම (Nightmares), කළකිරීම (Depression), උණ (Fever), සහ මානසික කැලඹීම (Agitation) ප්‍රධාන වේ. මත්පැන් ඇතිවීමේ රෝග ලක්ෂණ නැවැත්වීම සඳහා හින්දු ඇතිකරන ඖෂධ, විටමින් සහ පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ලබාදීම කළ යුතුය. මත්පැන් හා බැඳුණු සංකූලතා වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සහ ආරම්භ වියදම් සහ වඩාත් උපදේශණය ද කළ යුතුය.

දිගුකාලීන පුනර්ත්ථාපනය

ඉන්පසුව සමාජගත කිරීමේදී නිරන්තරයෙන් වෛද්‍ය සේවා අධීක්ෂණය සිදුකළ යුතුය. මෙහිදී කාර්ය සහ මානසික තත්වය පිළිබඳව අධීක්ෂණය කළ යුතුය. මානසික පෞච්ඡයට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ සඳහා අධීක්ෂණය කළ යුතුය.

බිඳුණු ආරම්භක ගෞරවය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මත්පැන් මිදුණු අයගේ සංගමයක ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙක් බවට පත්විය යුතුය.

අධ්‍යාපන වර්ධනය සඳහා ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් හා සමීප සබඳතාවයක් ඇති කළ යුතුය. විනෝද මාර්ගෝපදේශකත්වය අවශ්‍ය අතර ඒ සඳහා ලබා සලකා දිය යුතුය.

ප්‍රකාශනය
සැලසුම් හා තොරතුරු සලකුණකරණ ඒකකය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සබරගමුව

අනුමැතිය
ලෝක බැංකු සෞඛ්‍ය ආරාමය සංවර්ධන වැඩසටහන

මනට තිබුණු වැඩසටහන

මද්‍යසාර අයවහාවිතය "බේබදුකම"

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සබරගමුව

මධ්‍යසාර අයවහාවිතය - Alcohol Abuse

මත්පැන් භාවිතයේ ප්‍රමාණය අනුව විවිධ ගැටළු සහගත තත්වයන් ඇති කරවයි. කල් ගතවත්ම නොදැකීම ඇතිවෙයි.

සිතීමේ, හිස්වය කිරීමේ සහ හැසිරීමේ හැකියාව මධ්‍යම ස්නායු පද්ධතිය අකර්මකය වීම මගින් සිදුවේ. වැඩි වශයෙන් මත්පැන් ගැනීමත් සමඟ නිවැරදිව සිටීමේ හැකියාව නැතිවේ. මත්පැන් ගන්නා ප්‍රමාණය සීමා කිරීමේ හැකියාව ද නැතිවේ.

මත්පැන් නිරන්තරයෙන් නොකඩවා ගැනීම මගින් ගතවත් සහ පවුලේ අය සමඟ ඇති සබඳතා වලටත්, පාසලේ, කාර්යාලයේ, ගෞරවදායක කටයුතු වගකීම් වලටත් හානි සිදුකර ගනී. බීමත් වැරදි හැසිරීම් හා වාහන පදවීම වැනි කාරණා සම්බන්ධව නීතියේ රැකවීම සමහරක්ව හසුවේ. මත්පැන් ගන්නා ප්‍රමාණය සහ වාර ගණන අනුව මට්ටම් කිහිපයකට බොහෝ පුද්ගලයින් හදුනාගන්න පුළුවන.

Social drinker - සමාජයේ පිළිගත හැකි මට්ටමෙන් (සමාජයීය)
Heavy Social drinker - (බහුල සමාජයීය)

- සමාජයේ පිළිගත හැකි මට්ටමෙන් බීම කළත් නිතර එවැනි අවස්ථා සොයන හා දිනකට දෙවරක්වත් බොහෝ.

Problem drinker (ප්‍රශ්නකාරී)

- තදින් බොහෝ නිතර බීමකින් සිටින, ගැටළු මතු කරන ඉන් වෛද්‍ය, නීති, සමාජ හා මානසික ගැටළු පෙන්වූ කාරණා හමුවූ කිහිප විට මත්පැන් ඉවත් වීමට හැකිකළ.

Alcohol dependent - (ඇබ්බැහි වූ)

- මානසික තත්වය ගත කිසිදු තැනකට නොකර වැඩි ප්‍රමාණයක් බීම, සිසිලි දේ පානය හා මත්පැන්ට මුල්ප්‍රාප්ත වීම. කොතරම් බීමත් එය ඇසට හුරු වීම.
- මත්පැන් මට්ටම පහත වැටුණහොත් මත්පැන් ඇතිවීමේදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ පෙන්වූ කෙරේ.
- බීම විධිසහයක් බවට පත්වේ.

Severely deteriorated - (බරපතල ලෙස වනාකුල වූ)

මත්පැන් විෂ වීම, තමාගේ හෝ වටපිටාව ගැන හැකිම නැ. බොහෝ විට තුවාල කර ගැනීම සඳහා රෝහල් ගත කිරීම.

සමාජ ගැටළු (Social Problems)

01. Accidental Death and Injury - හදිසි මරණ හා තුවාල
02. Crime - අපරාධ
03. Suicide - සියදුහි නසා ගැනීම
04. Economic Cost - ආර්ථික බර
05. Other - වෙනත් වැඩි වූ ස්වාමිකරු සහ සමාජ අහිමි වීමේ ව්‍යාප්තිය
06. Accidents - අනතුරු

බේබදුකමට හේතු (Causes of Alcohol abuse)

ජානමය හේතු - (Genetic factors)
පරිසර සාධක - (Environmental factors)
සමාජ සංස්කෘතික සාධක - (sociocultural factors)

Alcohol abuse and Alcohol dependence (බේබදුකම සහ මත්පැන් ඇබ්බැහිවීම)

රෝග ලක්ෂණ (Symptoms - රෝගීය අත්විදින රෝග ලක්ෂණ)

Acute - (කැපී පෙනෙන)

- හැඟින නැවත වීමේදී - (Recurrent intoxication)
- සිහිමුරු වීම - (Blackouts)
- ඔත්කාරය - (Nausea)
- දහඩිය දැමීම - (Sweating)
- කැඩී වැඩි වැඩිවීම - (Tachycardia)
- වේරිලීම - (Tremor)
- අපස්මාර ස්වභාවය - (Seizure)
- හැඩි දෝෂ ඇති බව දැකීම - (Hallucinations)
- මත්පැන් අඩු වූ විට ඇතිවන කාර්ය සහ මානසික විනාශකාරීතාවය - (Delirium Tremens))

Chronic - (දිගුකාලීන)

- මානසික තත්වය ඉහල පහල යාම - (Mood Swings)
- කලකිරීම - (Depression)
- නොසන්සුන්තම - (Anxiety)
- හින්දු හොහොම - (Insomnia)
- බඩපිරුණීම - (Dyspepsia)
- ඔත්කාරය - (Nausea)
- පාචනය - (Diarrhea)
- බඩ පිළුම - (Bloating)
- ලේ වීමනය - (Haematemesis)
- ඇඟ හෙවීම - (Jaundice)
- අස්ථාවර ගමන් වීම - (Unsteady Gait)
- හිරිහිරි - (Paraesthesia)
- මතකය නැතිවීම - (Memory loss)
- ලිංග ප්‍රාණවත් නොවීම - (Erectile dysfunction)

වෙනත් ලක්ෂණ - (Other Signs)

- නිසලතා හදුන්වන මත්පැන් බීම - (Heavy, regular alcohol consumption)
- හදිසි දුම්පානය කිරීම - (Heavy Cigarette Smoking)
- මන්ද පෝෂණය - (Poor nutrition)
- හැඟින පෙළ ගැස්වීමේ නොහැකිතාවය - (Inability to articulate feelings)
- විවිධකාරී මානසිකව ඇතිකරන කාර්ය රෝගාබාධ - (Multiple Psycho somatic problems)
- ඉබේ ගබ්සාවීම - (Spontaneous abortion)
- කඩ පන්ද දරුවන්ට මත්පැන් ඇතිකරන රෝග තත්වය - (Child with fetal alcohol syndrome)
- ගෞරව කිසිකම හා ලිංගික අපවාර - (Domestic Violence & sexual abuse) නිතර වැරදි නො වූ තුවාල - (Frequent falls or Minor trauma)
- වැඩට නොපැමිණීම - (Absenteeism from work)
- අන්තර් පුද්ගල, මුදල් සහ නීති ගැටළු - (Interpersonal, Financial and legal problems)
- අනතුරු, පිළිසිදුම්, සිංසන - (Accidents, burns, Violence)
- සියදුහි නසා ගැනීමේ තැන - (Suicide attempts)
- මානසික වලට අනපේක්ෂිත ප්‍රතිචාර දැක්වීම - (Unexpected response to Medication)

රෝග විනිශ්චය

රෝගීය සමඟ සූදානම් කතාවක කළ යුතුය. රෝග ඉතිහාසය විමසීම මගින් මත්පැන්ට අදාලව රැකියාවේ, පාසලේ හෝ පවුලේ දුක්කරන පිළිබඳව අදහසක් ගත හැකිය.

එදාම පර්යේෂණය කරන මත්පැන් ප්‍රමාණය කොපමණ අධි විමසිය හැක. සාමාන්‍යයෙන් රෝග ප්‍රමාණයන්හි අතරස්ථතාවය දැක්වෙන සටහන පහත දැක්වේ.

	ප්‍රථම	සර්ව
අවදානම් බීම	සතියකට බීම 14 කට වඩා හෝ එක් අවස්ථාවකදී බීම 4 කට වඩා හැකිවීම	සතියකට බීම 7 කට වඩා හෝ එක් අවස්ථාවකදී බීම 3 කට වඩා හැකිවීම
තද මත්පැන් පානය	දිනකට බීම 5 හෝ 6 කට වඩා	දිනකට බීම 3 හෝ 4 කට වඩා

බීම වඩාත් යහු : ස්පිරිතු මිලි. 1.5 ක් හෝ වඩාත් මිලි. 5 ක් හෝ වඩාත් මිලි. 12

යම්කුට මත්පැන් ගැටළු මතු වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට CAGE ප්‍රශ්නාවලිය යොදාගන්න පුළුවන. මෙය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රශ්න වලදී ලැබෙන ධනාත්මක පිළිතුරු මගින් තීරණය කරන මත්පැන්ට අදාල ගැටළු මතු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති බවයි.